

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE" Arras - Tél. 21.04.21
(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE - SEINE-MARITIME)

Régisseur de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 13, Grand'Place - 62 - ARRAS

C.C.P. LILLE 5701-50

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

Supplément n° 2 au N° 116
14 Mai 1970

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

CULTURES FRUITIÈRES

Les dernières pluies, souvent abondantes, et les orages ont accru assez sensiblement le nombre des projections d'ascospores. La persistance des durées d'humectation du feuillage a permis de graves contaminations, les plus graves enregistrées jusqu'à présent.

A la suite de ces pluies importantes la protection des arbres est maintenant amoindrie.

Comme nous pouvions aisément le prévoir, la période critique dans l'évolution des Tavelures vient de commencer. Les risques de contaminations, à chaque pluie persistante, ne manqueront pas de s'intensifier avec l'apparition des toutes premières taches sur fruits ou feuilles. Ces taches pourraient apparaître dans les derniers jours du mois, tant sur pommiers que sur poiriers, et ce en nombre déjà notable. Dans l'immédiat, aucune tache n'a pu être observée ; cependant, une faible apparition est possible dans les jours qui viennent, particulièrement sur poiriers.

Renouveler les traitements dès réception et maintenir une protection parfaite des vergers durant les jours qui viennent et particulièrement en fin de mois.

IL EST RAPPELE que les traitements doivent être renouvelé après chaque pluie importante pouvant "lessiver" les produits et ceci sans attendre un avis de la Station

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER : Le temps frais est peu favorable aux contaminations, cependant, il est prudent d'éliminer par la taille les pousses oidiées et de poursuivre la lutte chimique dans les vergers sujets à cette maladie.

HOPLOCAMPE DU POMMIER : Dans les vergers, habituellement sujets aux attaques de ce ravageur, réaliser un traitement au 3/4 de la chute des pétales.

PUCERONS - TORDEUSES VERTES : Activité réduite. Si ce n'est déjà fait, appliquer un insecticide sur Pommiers avant floraison.

AVERTISSEMENTS

GRANDES CULTURES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Cette année encore, cette maladie est de nouveau fidèle au rendez vous et les premières manifestations ont pu être décélées, comme prévu, sur tas de déchets, dans la région Sud-Est de la Somme (Péronne-Ham) . Il s'agit là de nombreuses taches avec foyer.

Nous renouvelons notre demande et prions toutes personnes de bien vouloir nous en tenir informés rapidement de l'apparition éventuelle de taches sur ces tas de déchets.

Tournez l'il-vous plaît

Les dernières pluies ont pu assurer des repiquages sur les cultures voisines de tas de déchets ou même dans les situations exceptionnellement favorables à un développement précoce de la maladie : proximité de bois, de talus ou de fossés et, en général, tous lieux abrités, humides et soumis à des températures favorables. IL EST RAPPELE que des attaques précoces de mildiou peuvent être engendrées par la présence de repousses ou de tubercules faiblement contaminés présents dans les sols.

Dans ces situations exceptionnelles, et particulièrement sur variétés hâtives, présentant à la date du 10 Mai un développement suffisant, il sera prudent de réaliser un premier traitement à une date encore difficile à préciser en raison des températures actuellement assez fraîches.

En cas d'élévation sensible des températures, des sorties de rares taches pourraient être observées vers le 20 Mai. Si le temps demeurerait frais, ces taches ne sortiraient qu'entre le 20 et le 27 Mai.

!! Rester vigilant et assurer éventuellement la protection des cultures en cas de pluie
!! au cours de cette période et ceci surtout en situations particulièrement favorables au déve-
!! loppement précoce du Mildiou.

8 CONCOURS MILDIOU DE LA POMME DE TERRE 8

Comme chaque année, la Station d'Avertissements Agricoles organise un concours pour la détection des premières taches de Mildiou de la POMME DE TERRE en plein champ.

Des primes de 50 F et 30 F seront adressées ultérieurement aux premières personnes dans chaque département qui nous auront adressé les premières taches de mildiou.

Les envois de feuilles seront réalisés exclusivement entre deux buvards légèrement humides. Proscrire l'utilisation du plastique qui favorise la décomposition des feuilles ou des plants pendant le transport.

!! Indiquer avec précision : le Nom et l'Adresse de l'Observateur,
!! la date et le lieu de l'observation,
!! la variété : date de plantation, date de levée,
!! l'importance de l'attaque : rares taches - foyer.

Nous remercions, dès à présent, tous ceux qui, par leur envoi nous auront renseigné sur les premières manifestations de la maladie

PEGOMYIE DE LA BETTERAVE : Dès premières pontes éparses ont pu être observées dans d'assez nombreuses régions de Picardie.

INFORMATIONS

CULTURES LEGUMIERES

SEPTORIOSE DU CELERI : La protection des jeunes plants peut être assurée avec : Produits cupriques : 250 g de cuivre - Oxyquinoléate de cuivre : 60 g - Manèbe, Mancozèbe ou Captafol : 160 g - Propinèbe : 210 g - Doguadine : 100 g - Carbatène + Manèbe : 40 g + 120 g de matière active à l'hectolitre.

Dernière note : Bulletin n° 116 avec supplément n° 1 en date du 5 Mai 1970.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

P. COUTURIER

G. CONCE